



BUSULFAN	שם התרופה:
Myleran	שם מסחרי:
טבליות לבנות בחוזק של 2 מ"ג	צורת הגשה:
טיפול בלויקמיה והכנה להשתלת מח עצם	מטרת הטיפול:

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש ליטול את התרופה עם כוס מים בזמנים קבועים

**תגובות בין תרופתיות:**

- רצוי להימנע מטיפול בתרופה פלג'יל בעת הטיפול בתרופה זו

**תופעות לוואי:**

- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- סחרחורת, כאב ראש, חוסר שינה, חולשה ועייפות
- כאבים בחזה, יתר לחץ דם, דופק מואץ, בצקת
- בחילה, הקאות, חוסר תיאבון, שינויים בטעם, קושי בבליעה, דלקת ברירת הפה וירידה במשקל
- שלשולים או עצירות
- פריחה
- חרדה
- שיעול, נזלת
- חום, כאבים, צמרמורת
- כאבי ראש, שיעול, נזלת, כאב גרון או כאבים בגוף
- כאבי פרקים, כאבי שרירים
- אבדן תיאבון, בחילה, הקאות, יובש בפה, גיהוקים, ירידה במשקל, התכוות של העור

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- כיבים בפה, בושט ובפי הטבעת הגורמים לכאב ולדימום
- כאבים בחזה
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- צואה דמית או שחורה
- שיעול עם ליחה דמית
- פרכוסים
- שטף דם, דימום לא סביר, חולשה או חיוורון

BUSULFAN



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו