



שם התרופה:	CAPECITABINE
שם מסחרי:	Xeloda
צורת הגשה:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• כדור בצבע אפרסק כהה בחוזק של 500 מ"ג</li> <li>• כדור בצבע אפרסק בהיר בחוזק של 150 מ"ג</li> </ul>
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן שד, ראש צוואר, קיבה ומעי, בלוטת האדרנל ודרכי המרה

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום.
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- את התרופה נוטלים ב-2 מנות בהפרשים של 12 שעות
- יש ליטול את הטבליה בשלמותה עם כוס מים תוך חצי שעה מסיום הארוחה
- יש לשים לב לתכנית הטיפול ולהפסקות בין המחזוריים לפי הנחיות הצוות

**דגשים בטיפול:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת הדם וכימיה לפני התחלת כל מחזור טיפול
- במידה והניך סובל מבעיות לב, כליות או כבד יש לדווח לרופא האונקולוג המטפל


**תופעות לוואי:**

- תסמונת כף היד והרגל (Hand and foot syndrome) העלולה להתבטא בנפיחות כאבים אדמומיות ורגישות ו/או יובש בכפות הרגליים והידיים שינויים בתחושה, עקצוץ ונימול, שלפוחיות וקילוף העור, בצקות וכאבים
- עייפות וחולשה
- בצקת
- קוצר נשימה
- דלקת בעור
- כאבי בטן, עצירות, שלשול, אבדן תיאבון, בחילה, כיבים בפה, הקאות
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- עלייה ברמת הבילירובין בדם
- גירוי בעיניים
- נמלול או עקצוץ בעור
- חום

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:**

- חום מעל 38 או סימנים אחרים לזיהום כגון כאב גרון או צמרמורת
- תגובה אלרגית כולל גרד או פריחה, נפיחות בפנים, בידיים או ברגליים, נפיחות או עקצוץ בפה או בגרון, קוצר נשימה
- כאבים בחזה או דופק לא סדיר
- דימום או שטפי דם יוצאי דופן
- עייפות או חולשה יוצאי דופן
- שינויים בצבע העור ובהפרשות
- שלשולים מעל 4 פעמים ביום או דם בצואה

CAPECITABINE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו