



שם התרופה:	ERLOTINIB
שם מסחרי:	Tarceva
צורת הגשה:	טבליות לבליעה בחוזק של 25, 100 ו-150 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC וסרטן לבלב

הנחיות כלליות:

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התכשיר:

- יש ליטול את התרופה בשלמותה על בטן ריקה, כשעה לפני או שעתיים לאחר הארוחה או לפני השינה כדי להקטין את הסיכון לבחילה
- אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- יש להקפיד על שתייה של 8-10 כוסות נוזלים ביום

דגשים בטיפול:

- עישון מפחית את יעילות תרופה זו. מומלץ להפחית את כמות הסיגריות או להפסיק לעשן ולדווח לרופא המטפל
- יש לעקוב אחר בדיקות כימיה בדם, מינון הטיפול יותאם לפי החלטת הרופא

תגובות בין תרופתיות:

- תרופה זו מעלה את הסיכון לדימומים בטיפול משולב עם אספירין, קומדין או תרופות נוגדות דלקת

תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/ פנייה לטיפול דחוף:

- חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- שיעול, כאב גרון, כאבים בגוף
- אלרגיה: פריחה, גרד, נפיחות
- כאבים בחזה או קוצר נשימה
- פגיעה פתאומית בדיבור, בראייה או ביכולת להזיז יד או רגל
- פרכוסים
- שטף דם לא שגרת, דימום

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, כימיה ובדיקות שתן לנוכחות תאי דם אדומים וסימנים אחרים לפגיעה בכליות או בדרכי השתן

תופעות לוואי:

- בצקת
- כאבים בחזה
- התקרחות, פריחה וגרד בעור
- ירידה במשקל, אבדן תיאבון, בחילה, הקאות, כאבי בטן, שלשול, גאזים, צרבת
- עלייה ברמת הבילירובין ותפקודי הכבד בדם
- זיהומים
- שינויים בצבע העור וההפרשות
- כאבים בעצמות או בשרירים, כאבי ראש
- דלקות עיניים
- חרדה, דכאון
- שיעול, קוצר נשימה
- עייפות
- חום
- שלפוחיות או קילוף מסיבי של העור

ERLOTINIB



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
 * המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו