



שם התרופה:	IBRUTINIB
שם מסחרי:	Imbruvica
צורת הגשה:	כמוסות בחוזק של 140 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בלימפומה מסוג MCL ולויקמיה לימפוציטית כרונית (CLL)

הנחיות כלליות:

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התרופה:

- יש ליטול את התרופה עם כוס מים בזמנים קבועים
- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה אחת לחודש
- אין לאכול אשכוליות או תפוזי חושחש (Seville Orange) או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- יש להקפיד על שתייה של לפחות 6-7 כוסות נוזלים ביום
- לפני ואחרי ניתוח, יש לשקול הפסקת התרופה ל: 3-7 ימים (בכל פעולה כירורגית כמו גם עקירת שן)

תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:

- חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- תופעות אלרגיה חמורות: קשוי נשימה - להפסיק את הטיפול ולפנות לחדר מיון
- פריחה, נפיחות בפנים או כפות הידיים, נפיחות ועקצוץ בפה או בגרון
- דימומים (למשל ממערכת העיכול) או שטפי דם יוצאי דופן
- ירידה בתכיפות ובכמות השתן, כאב בצד או בגב תחתון
- שלשולים מעל 4 פעמים ביום
- קצב לב מהיר או לא סדיר, סחרחורת או עילפון
- חולשה יוצאת דופן

תופעות לוואי:

- בצקת
- פריחה
- עלייה בריכוז חומצה אורית בדם
- כאבי בטן, עצירות, שלשול, ירידה בתיאבון, בחילה, הקאה, כיבים בפה
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה בספירת תאי דם אדומים, נויטרופילים ובהמוגלובין ועלול להתבטא בדימומים מהאף, מהחניכיים ומפי הטבעת
- כאבי פרקים ושרירים

IBRUTINIB



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. * המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו