



שם התרופה:	EVEROLIMUS
שם מסחרי:	Afinitor
צורת הגשה:	טבליות לבליעה בחוזק של 2.5, 5, 10 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן כליה וסרטן שד

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- אין ליטול תרופה זו במקרה של רגישות ידועה לתרופות דומות כגון Torisel (Temsirolimus) או Rapamune (Sirolimus)
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במקרה ששכחת ליטול את התרופה, ניתן ליטול אותה עד 6 שעות מאוחר יותר מזמן הנטילה הרגיל שלך
- אין ליטול מנה כפולה
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסונים
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- יש ליטול את התרופה פעם ביום עם כוס מים בזמנים קבועים

**דגשים בטיפול:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם וכימיה, לפני תחילת כל מחזור הטיפול ולפי הנחיית הצוות המטפל
- לפני תחילת הטיפול בתרופה יש לסיים טיפול בזיהומים חידקים ו/או פטרייתיים
- תרופה זו יכולה לגרום רגישות של העור לשמש. יש להקפיד להשתמש בקרם הגנה עם מסנן קרינה 34 לפחות
- אין לאכול אשכוליות או לשנות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)

**תופעות לוואי:**

- שיעול, קוצר נשימה, זיהומים בדרכי הנשימה
- כאב גרון וכאבים בנזף
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לזיהומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידית/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליה בחום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- קוצר נשימה ושיעול טורדני, נפוחות בפנים, בידיים, ברגליים, בלשון או בגרון
- הפרעות בראייה
- כאבים בחזה או שינוי קיצוני בקצב הלב (מהיר או איטי)
- ירידה חמורה בתדירות וכמות השתן, כאבים במתן שתן, שתן עכור או דמי
- כאבי שרירים, רעד, בחילה והקאות
- דימום/חולשה משמעותיים

- לחץ דם גבוה, בצקת ברגליים/ידיים
- פצעים, כיבים או כתמים לבנים בשפתיים, בפה או בלוע
- שינויים בעור
- עלייה ברמת הסוכר והשומנים בדם, ירידה ברמת החלבון והזרחן בדם. גוון צהבהב בעור או בעיניים
- עצירות, שלשול, ירידה בתיאבון, בחילה, הקאות, קושי בבליעה
- חריגה בתוצאות בדיקות תפקודי הכבד
- עיכוב בריפוי פצעים
- דלקות אזניים
- ירידה בתפקוד הכליות, זיהומים בדרכי השתן
- שינויים בוסת (כולל היעלמותה)
- עייפות, חום

EVEROLIMUS



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	ABIRATERONE ACETATE
שם מסחרי:	Zytiga
צורת הגשה:	טבלייות לבליעה במינון של 1000 מ"ג (ארבע טבלייות של 250 מ"ג) אחת ליום.
מטרת הטיפול:	לטיפול בסרטן ערמונית

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- את התרופה יש ליטול בשלמותה על בטן ריקה עם כוס מים לפחות שעה לפני או שעתיים אחרי הארוחה
- אין להפסיק טיפול זה אף לזמן קצר מבלי להיוועץ ברופא
- ירידה בספירת הדם הלבנה והאדומה
- חריגה בתפקודי הכבד. שתן כהה, צואה בהירה, הקאות, אבדן תיאבון או כאבי בטן. צבע צהבהב בעיניים או בעור
- עלייה מהירה במשקל או בצקת
- נפיחות בפרקים, כאבי שרירים
- שיעול, דלקת בדרכי הנשימה העליונות, קוצר נשימה ודלקת בלוע

**דגשים בטיפול:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם וכימיה, לפני תחילת כל מחזור הטיפול ולפני הנחיות הצוות המטפל
- אין לאכול אשכוליות או לשותות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)


**תופעות לוואי:**

- בצקת, עלייה בלחץ הדם
- עייפות, חוסר שינה
- גלי חום
- עלייה ברמת השומנים, הסוכר והנתרן בדם. ירידה ברמת האשלגן והזרחן בדם
- יובש בפה, צמא, בחילה או הקאות
- עצירות, שלשול, צרבת
- דלקות בדרכי השתן

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- סחרחורת, עילפון
- כאבי שרירים
- לחץ או כאבים בחזה, קשיי נשימה, שינויים קיצוניים בדופק
- נפיחות בעור, בפנים, כף היד וכף הרגל
- עייפות קיצונית, חולשה או ישנוניות

ABIRATERONE ACETATE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדף ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	SUNITINIB
שם מסחרי:	Sutent
צורת הגשה:	כמוסות לבליעה בשני צבעים כתום וקרמל בחוזק של: 50 מ"ג, 25 מ"ג, 12.5 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן כליה, בסרטן מערכת דרכי העיכול – GIST ובסרטן לבלב (pNET).

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- יש ליטול את התרופה מדי יום למשך ארבעה שבועות ובסיומם שבועיים הפסקה או לפי הוראת הרופא האונקולוג המטפל
- אין לפתוח את הכמוסות, ללעוס או למהול עם סוגי מזון ומשקאות שונים
- אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- יש להימנע מטיפולי שיניים חודרניים בזמן הטיפול בתרופה זו

**דגשים בטיפול:**

- יש לבצע ספירת דם וכימיה ובדיקת חלבון בשתן לפני כל תחילת מחזור טיפול
- יש לעקוב אחר לחץ הדם וא.ק.ג.
- מעקב אקו לב נדרש במידה והנך סובל מבעיות לבביות, אירועים מוחיים וזרימת הדם ובהתאם להנחיית הרופא המטפל

**תגובות בין תרופתיות:**

- אין ליטול דיפלוקאן (פלוקונאזול) ומולטק יחד עם תרופה זו

**תופעות לוואי:**

- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מהחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- כאבי בטן, שלשולים, בחילה, הקאות, אי נוחות במערכת העיכול
- עלייה ברמת בילירובין בדם ובשתן
- כאב או זיהום בלסת
- שלפוחיות בכפות הידיים או הרגליים
- דלקת חניכיים, אבדן תיאבון, כאבים בפה, שינוי בתחושת הטעם
- שינוי בצבע השתן
- יובש בעור ובפה, פריחה
- ירידה בתפקוד בלוטת התריס
- פגיעה בתפקודי כבד
- כאב בזרועות וברגליים
- שיעול
- עייפות, חולשה

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידית/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורות.
- נפיחות בפנים, בפה או בגרון
- בלבול, סחרחורת או עילפון

- אבדן תחושה או חולשה בידיים, ברגליים או בצד אחד של הגוף
- הופעת כאב ראש חזק מאד או פתאומי או בעיות בראייה, בדיבור או בהליכה
- תסמונת כף היד והרגל (Hand and foot syndrome) העלולה להתבטא בנפיחות כאבים אדמומיות ורגישות ו/או יובש בכפות הרגליים והידיים, שינויים בתחושה, עקצוץ ונימול, שלפוחיות וקילוף העור, בצקות וכאבים
- עלייה מהירה במשקל, בצקת, תחושה של אי סדירות בקצב הלב או הנשימה, עייפות או חולשה קיצוניים
- כיבים או כתמים לבנים בפה או בגרון הגורמים לקושי בבליעה
- דם בשתן, בליחה, צואה כהה
- שלשולים מעל 4 ביום

SUNITINIB



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.  
 \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	CAPECITABINE
שם מסחרי:	Xeloda
צורת הגשה:	<ul style="list-style-type: none"> <li>כדור בצבע אפרסק כהה בחוזק של 500 מ"ג</li> <li>כדור בצבע אפרסק בהיר בחוזק של 150 מ"ג</li> </ul>
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן שד, ראש צוואר, קיבה ומעי, בלוטת האדרנל ודרכי המרה

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום.
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- את התרופה נוטלים ב-2 מנות בהפרשים של 12 שעות
- יש ליטול את הטבליה בשלמותה עם כוס מים תוך חצי שעה מסיום הארוחה
- יש לשים לב לתכנית הטיפול ולהפסקות בין המחזוריים לפי הנחיות הצוות

**דגשים בטיפול:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת הדם וכימיה לפני התחלת כל מחזור טיפול
- במידה והינך סובל מבעיות לב, כליות או כבד יש לדווח לרופא האונקולוג המטפל

**תופעות לוואי:**

- תסמונת כף היד והרגל (Hand and foot syndrome) העלולה להתבטא בנפיחות כאבים אדמומיות ורגישות ו/או יובש בכפות הרגליים והידיים שינויים בתחושה, עקצוץ ונימול, שלפוחיות וקילוף העור, בצקות וכאבים
- עייפות וחולשה
- בצקת
- קוצר נשימה
- דלקת בעור
- כאבי בטן, עצירות, שלשול, אבדן תיאבון, בחילה, כיבים בפה, הקאות
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- עלייה ברמת הבילירובין בדם
- גירוי בעיניים
- נמלול או עקצוץ בעור
- חום

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:**

- חום מעל 38 או סימנים אחרים לזיהום כגון כאב גרון או צמרמורת
- תגובה אלרגית כולל גרד או פריחה, נפיחות בפנים, בידיים או ברגליים, נפיחות או עקצוץ בפה או בגרון, קוצר נשימה
- כאבים בחזה או דופק לא סדיר
- דימום או שטפי דם יוצאי דופן
- עייפות או חולשה יוצאי דופן
- שינויים בצבע העור ובהפרשות
- שלשולים מעל 4 פעמים ביום או דם בצואה

CAPECITABINE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	ERLOTINIB
שם מסחרי:	Tarceva
צורת הגשה:	טבליות לבליעה בחוזק של 25, 100 ו-150 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC וסרטן לבלב

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- יש ליטול את התרופה בשלמותה על בטן ריקה, כשעה לפני או שעתיים לאחר הארוחה או לפני השינה כדי להקטין את הסיכון לבחילה
- אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- יש להקפיד על שתייה של 8-10 כוסות נוזלים ביום

**דגשים בטיפול:**

- עישון מפחית את יעילות תרופה זו. מומלץ להפחית את כמות הסיגריות או להפסיק לעשן ולדווח לרופא המטפל
- יש לעקוב אחר בדיקות כימיה בדם, מינון הטיפול יותאם לפי החלטת הרופא

**תגובות בין תרופתיות:**

- תרופה זו מעלה את הסיכון לדימומים בטיפול משולב עם אספירין, קומדין או תרופות נוגדות דלקת

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/ פנייה לטיפול דחוף:**

- חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- שיעול, כאב גרון, כאבים בגוף
- אלרגיה: פריחה, גרד, נפיחות
- כאבים בחזה או קוצר נשימה
- פגיעה פתאומית בדיבור, בראייה או ביכולת להזיז יד או רגל
- פרכוסים
- שטף דם לא שגרת, דימום

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, כימיה ובדיקות שתן לנוכחות תאי דם אדומים וסימנים אחרים לפגיעה בכליות או בדרכי השתן

**תופעות לוואי:**

- בצקת
- כאבים בחזה
- התקרחות, פריחה וגרד בעור
- ירידה במשקל, אבדן תיאבון, בחילה, הקאות, כאבי בטן, שלשול, גאזים, צרבת
- עלייה ברמת הבילירובין ותפקודי הכבד בדם
- זיהומים
- שינויים בצבע העור וההפרשות
- כאבים בעצמות או בשרירים, כאבי ראש
- דלקות עיניים
- חרדה, דכאון
- שיעול, קוצר נשימה
- עייפות
- חום
- שלפוחיות או קילוף מסיבי של העור

ERLOTINIB



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדף ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	DASATINIB
שם מסחרי:	Sprycel
צורת הגשה:	טבליה לבנה במינון של 100, 70, 50, 20 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בליוקמיה מיאלואידית כרונית, לויקמיה לימפובלסטית חריפה, סרטן ערמונית

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים בטיפול:**

- יש לעקוב אחר בדיקות כימיה בדם, מינון הטיפול יותאם לפי החלטת הרופא

**תופעות לוואי:**

- צבירת נוזלים בגוף, בצקת
- פריחה
- ירידה ברמות סידן, זרחן או אשלגן בדם
- כאבי בטן, שלשול, בחילה והקאות
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת.
- כאבים בפרקים או שרירים
- כאבי ראש
- עייפות

**דגשים על אופן הנטילה:**

- אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- תרופה זו ניתן לקחת ללא קשר לאוכל. במידה והתרופה גורמת לאי נוחות במערכת העיכול מומלץ לקחת אותה עם כוס מים מלאה ואוכל

**תגובות בין תרופתיות:**

- תרופה זו אסורה לשימוש יחד עם התרופה: פלוקנול (פלוקונזול)
- רצוי להימנע מנטילה של תרופות מסוימות לקיבה כגון אומפרדקס (לוסק), גסטרו (פאמוטידין) ולנטון (לנסו). במקומן עדיף להשתמש בסותרים חומצה כמו מאלוקס (במרווח של לפחות שעותיים מתרופה זו)

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- כיבים בפה, ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב או דימום
- בלבול, ישנוניות יתר ושינויים בהתנהגות.
- קוצר נשימה
- עליה מהירה במשקל, בצקת

DASATINIB



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	GEFITINIB
שם מסחרי:	Iressa
צורת הגשה:	טבליה בצבע כתום בחוזק של: 250 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSLC)

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועדה הקבוע, ניתן ליטול אותה באיחור של עד 12 שעות. אם עברו יותר מ-12 שעות יש לדלג על נטילת התרופה באותו יום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- במקרים של קושי בבליעה ניתן לשים את הטבליה בחצי כוס מים (כלי לשבור או לרסק אותה) ולערבב עד להמסת התרופה
- אין לאכול אשכוליות או לשותות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)

**תופעות לוואי:**

- שלשול
- בחילה והקאות, ירידה במשקל
- עור יבש, פריחה, אקנה, גרד
- שינויים בראייה
- חולשה, עייפות וחוסר שינה

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- שלשולים מעל ארבע פעמים ביום
- כיבים בפה, ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב או דימום
- בלבול, ישנוניות יתר ושינויים בהתנהגות.
- שינויים בראייה

**תגובות בין תרופתיות:**

- במקרה של נטילת קומדין במ'קביל לתרופה זו, תיתכן עלייה ברמת ה-INR המצריכה הקטנת מינון הקומדין

GEFITINIB



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



LAPATINIB DITOSYLATE	שם התרופה:
Tykerb	שם מסחרי:
קפלייה בצבע קרם בחוזק של 250 מ"ג	צורת הגשה:
טיפול בסרטן שד	מטרת הטיפול:

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן הנטילה:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש ליטול את התרופה על בטן ריקה לפחות שעה לפני או שעתיים אחרי ארוחה
- חשוב לבצע מעקב אחר תפקוד הלב והריאות
- אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- חוסר שינה
- קוצר נשימה
- תסמונת כף היד והרגל (Hand and foot syndrome) העלולה להתבטא בנפיחות, כאבים, אדמומיות ורגישות בכפות הרגליים והידיים, שינויים בתחושה, עקצוץ, שלפוחיות וקילוף העור בכפות הידיים והרגליים, בצקות וכאבים
- בחילה, הקאות, אבדן תיאבון או צבע צהבהב בעור או בעיניים

**תגובות בין תרופתיות:**

- אין ליטול תרופה זו יחד עם פלוקונול(פלוקונזול) או מולטק


**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורות
- כאבים בחזה, קוצר נשימה שינויים בלחץ דם או עייפות ניכרת
- כיבים בפה הגורמים לקושי בבליעה
- שלשולים מעל 4 פעמים ביום

**תופעות לוואי:**

- שלשול, בחילה והקאות
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת.
- חולשה ועייפות משמעותית (לאות)
- פריחה
- כאבי ראש וכאבים בזרועות ורגליים

LAPATINIB DITOSYLATE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו





שם התרופה:	LENALIDOMIDE
שם מסחרי:	Revlimide
צורת הגשה:	קפסולה בצבע לבן או משולב תכלת ולבן בהתאם לחוזק התרופה: 5, 10, 15, 25 מ"ג
מטרת הטיפול:	תסמונת מיאלואידית (MDS), מיאלומה נפוצה

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועדה הקבוע, ניתן ליטול אותה באיחור של עד 12 שעות. אם עברו יותר מ-12 שעות יש לדלג על נטילת התרופה באותו יום
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש ליטול את התרופה עם כוס מים בזמנים קבועים
- אדמומיות, קילוף או שלפוחיות בעור
- שתן כהה או צואה בהירה, בחילה, הקאות, אבדן תיאבון, כאב בטן, צבע צהבהב בעור או בעיניים
- כאבים בשוקיים

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידית/ פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- כיבים בפה, בושט ובפי הטבעת הגורמים לכאב או לדימום
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- שינוי בתכיפות מתן שתן
- קצב לב לא סדיר או פרכוסים
- כאבים בחזה, קושי בנשימה או קיא דמי
- ירידה בתחושה או חולשה בצד אחד של הגוף, כאב ראש פתאומי או חזק מאד, בעיות עם הראייה, הדיבור או הליכה
- שטפי דם, דימום יוצא דופן או חולשה

**תופעות לוואי:**

- בצקות
- פריחה
- ירידה במשקל
- סחרחורת, כאב ראש, רעד
- טשטוש ראייה
- שיעול, קוצר נשימה, דלקת גרון
- עייפות ולאות
- חום
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- התכווצויות בשרירי הרגליים, כאבי פרקים, כאב גב
- שלשולים, עצירות, בחילה והקאות

LENALIDOMIDE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדף ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	SORAFENIB
שם מסחרי:	Nexavar
צורת הגשה:	טבליות לבליעה בצבע אדום חוזק 200 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן כליה ובסרטן הכבד.

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/ פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורות
- כאבים בחזה, קוצר נשימה או הזעה יוצאת דופן
- סחרחורת או עילפון
- שינויים בדופק הלב
- דימומים מהאף, בשתן, בצואה ושטפי דם בעור

**תופעות לוואי:**

- עלייה בלחץ הדם
- התקרחות, קילוף של העור, פריחה
- בחילה, הקאות, אבדן תיאבון, כאבי בטן, צבע צהבהב בעור או בעיניים
- תסמונת כף היד והרגל (Hand and foot syndrome) העלולה להתבטא בנפוחות, כאבים, אדמומיות ורגישות בכפות הרגליים והידיים, שינויים בתחושה, עקצוץ ונימול, שלפוחיות וקילוף העור בכפות הידיים והרגליים, בצקות וכאבים.
- ירידה ברמת האלבומין, הסידן או הזרחן בדם
- ירידה במשקל, כאבי בטן, ירידה בתיאבון, שלשול, בחילה
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת.
- עלייה בתפקודי כבד
- עייפות
- זיהומים
- כאבים

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- את התרופה יש ליטול על בטן ריקה עם כוס מים, לפחות שעה לפני הארוחה או שעתיים אחרי הארוחה
- אין ללעוס, למהול ולהמיס את התרופה עם סוגי מזון ומשקאות שונים

**דגשים בטיפול:**

- השימוש בתרופה עלול להעלות את הסבירות לדימומים. במידה והינך משתמש בתרופות לדילול הדם יש ליידע את האונקולוג המטפל
- השימוש בתרופה עלול להשפיע על קצב ריפוי פצעים
- במהלך תקופת הטיפול בתרופה יש לבצע מעקב וניטור אחר ערכי לחץ דם ולבצע בדיקות דם לכימיה ושתן, לפני התחלת כל מחזור טיפולי וא.ק.ג. לפי החלטת הרופא המטפל

**תגובות בין תרופתיות:**

- תרופה זו אסורה בשימוש עם תרופות כגון מולטק, דיפלוקן (פלוקנול)

SORAFENIB



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.  
 \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	PAZOPANIB
שם מסחרי:	Votrient
צורת הגשה:	טבליות לבליעה בחוזק של: 200 מ"ג ו- 400 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן כליה וסרקומה

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- את התרופה יש ליטול על בטן ריקה עם כוס מים, לפחות שעה לפני הארוחה או שעתים אחרי הארוחה
- אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)

**דגשים בטיפול:**

- לפני ניתוח יש להפסיק את הטיפול בתרופה עד הבראה מלאה של הפצע הניתוחי
- לפני ובמהלך הטיפול יש לבצע בדיקת דם לאלקטרוליטים, תפקודי כבד, בלוטת התריס וחלבון בשתן
- לפני ובמהלך הטיפול יש לבצע מעקב לחץ דם ומעקב לבבי. (אקו לב לפי המלצת הקרדיולוג)
- יש להימנע מטיפול בתרופה זו במידה וסבלת משיעול דמי, דימום מוחי ודימום בדרכי העיכול העליונות במהלך 6 חודשים אחרונים

**תגובות בין תרופתיות:**

- קארבאמזפין, פנוברביטאל ודקסמטזון עלולים להפחית את ריכוז התרופה בדם
- תרופה זו אסורה בשימוש עם תרופות כגון: דיפלוקן (פלוקונול) ומולטק
- יש להימנע משימוש בתרופות לקיבה כגון לוסק (אומפרדקס), גסטרו (פאמו), לנטון (לנסו), נקסיום או קונטרולוק עקב הפחתה משמעותית ביעילות התרופה. יש להעדיף תרופה כמו קאראפייט או מאלוקס במינון חד יומי בבוקר וליטול את הוטרנינט בערב

**תופעות לוואי:**

- יתר לחץ דם
- שינוי בצבע השיער
- שיעול, כאב גרון או כאבים בגוף
- ירידה ברמת האלבומין, המגנזיום, הנתרן והזרחן בדם
- שינויים או דימומים בעור ובהפרשות
- ירידה במשקל, ירידה בתיאבון, שלשול, בחילה
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- עלייה בתפקודי כבד ובילירובין בדם
- כאבים בשלד ובשרירים, כאב ראש
- עייפות

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- עלייה חדה בלחצי דם
- כאבים בחזה עם הקרנה לזרועות וללסת
- דופק מהיר או לא סדיר, סחרחורת
- דימום ו/או חולשה יוצאי דופן
- נפיחות בידיים או ברגליים, קוצר נשימה
- הרדמות או חולשה בצד אחד של הגוף, כאב בשוקיים, כאב ראש פתאומי או חריף, בעייה בראייה/דיבור/הליכה, בלבול, פרכוסים
- תגובה אלרגית: פריחה, נפיחות בידיים או בפנים, בפה או בגרון, קוצר נשימה ולחץ בחזה

PAZOPANIB



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	ESTRAMUSTINE
שם מסחרי:	Estracyt ,Emcyt
צורת הגשה:	קפסולות בחוזק של 140 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן הערמונית

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לאחסן את התרופה במקרר, התרופה יכולה לשהות בטמפרטורת החדר עד 48 שעות
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- יש ליטול את התרופה על בטן ריקה עם כוס מים, לפחות שעה לפני הארוחה או שעתים אחרי הארוחה

**דגשים בטיפול:**

- לפני תחילת הטיפול ומידי שבוע במהלך הטיפול יש לבדוק שינויים ברמות סידן וזרחן
- יש לעקוב אחר שינויים בתפקודי הכבד, רמת בילירובין ורמת טסטוסטרון בדם
- יש לעקוב אחר לחץ הדם
- יש לדווח לרופא האונקולוג המטפל על מחלות רקע ונפיחות ברגליים ו/או קוצר נשימה

**תגובות בין תרופתיות:**

- באם הנך נוטל סידן או כדורי Tums (טאמס), יש לקחת אותם שעה לפני או שעתים אחרי תרופה זו

**תופעות לוואי:**

- בצקת
- רגישות ו/או הגדלה של השדיים
- שלשול, גירוי מערכת העיכול, בחילה
- התכווצויות ברגליים
- קוצר נשימה
- כאבים, אדמומיות או חום בשוק או בזרוע

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליה בחום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- קוצר נשימה וכאבים בחזה
- תגובה אלרגית כולל גרד ו/או פריחה, נפיחות בפנים ובידיים, נפיחות ועקצוץ בפה או בגרון
- כאב ראש חזק או פתאומי, בלבול ובעיות ראייה

ESTRAMUSTINE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	TEMOZOLOMIDE
שם מסחרי:	Temodal
צורת הגשה:	קפסולות של 5 מ"ג, 20 מ"ג, 100 מ"ג, 250 מ"ג
מטרת הטיפול:	לטיפול בגידולי מח ומלנומה

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לאחסן תרופה זו במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- יש ליטול את המנה פעם ביום
- יש ליטול התרופה על קיבה ריקה: שעה לפני האוכל או כשעתיים לאחר האוכל או לפני השינה כדי להקטין את הסיכוי לבחילה
- יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה עם כוס מים

**דגשים בטיפול:**

- רצוי ליטול תרופה למניעת בחילה המופיעה לעיתים קרובות עם טיפול זה
- השימוש בתרופה פוגע בערנות ומחייב זהירות בנהיגה ברכב ובהפעלת ציוד מסוכן ובהתנהלות היומיומית
- יש לבצע מעקב אחר ספירת הדם וכימיה לפני התחלת כל מחזור טיפול
- התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לרגישות בחולים הרגישים ללקטוז
- תרופה זו יכולה לגרום לדימומים, שטפי דם או זיהומים

**תגובות בין תרופתיות:**

- חשוב לדווח לרופא המטפל על נטילת תרופות מהקבוצות הבאות: רספרים, פניטואין, חומצה ולפורית ותרופות המדכאות את מערכת החיסון


**תופעות לוואי:**

- בצקת
- שלשול, עצירות, בחילה, הקאות
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- כאבי ראש
- עייפות
- התקרחות
- פריחה, קילוף או שלפוחיות בעור
- שיעול, כאב גרון וכאבים בגוף
- עייפות קיצונית וישנוניות
- שינויים בצבע העור או ההפרשות
- הקאות, אבדן תיאבון, כאבי בטן

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- קשיי נשימה-להפסיק את הטיפול ולפנות לחדר מיון
- דימום או שטפי דם יוצאי דופן
- פרכוסים

TEMOZOLOMIDE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדף ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.  
 \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	CYCLOPHOSPHAMIDE
שם מסחרי:	Cytoxan
צורת הגשה:	כדור בצבע לבן בחוּזק של 25 מ"ג, 50 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן שד גרורתי, סוגי לימפומה, לויקמיה, מיאלומה נפוצה, גידולי מוח וסרטן שחלות

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- יש ליטול את התרופה בשעות הבוקר, להקפיד על שתייה של 10-8 כוסות נוזלים ביום כדי לאפשר הפרשת התרופה בשתן במהלך היום

**דגשים בטיפול:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, כימיה ובדיקות שתן לנוכחות תאי דם אדומים וסימנים אחרים לפגיעה בכליות או בדרכי השתן
- יש ליידע את הרופא על נטילת התרופה במקביל לטיפול קרינה

**תופעות לוואי:**

- התקרחות, שינוי בצבע העור, נזק לצפרניים, פריחה
- אי נוחות בבטן, שלשול, אבדן תיאבון, בחילה, הקאות
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- הפסקת ווסת

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליה בחום מעל 38 וצמרמורת
- דימום בשתן (Hemorrhagic Cystitis) או בצואה
- פריחה, גרד או נפיחות המלווה בקושי בנשימה, עקצוץ או נפיחות בגרון
- כאב בחזה, דופק מהיר ולא סדיר

CYCLOPHOSPHAMIDE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.  
 \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	ETOPOSIDE
שם מסחרי:	VP-16 , Vepesid
צורת הגשה:	קפלויות לבליעה. בחוזק של 50 מ"ג ו 100 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן אשכים, סרטן שד, סרטן ראות, לימפומה, לויקמיה, הודגליקין, סרטן שחלות והשתלות מח עצם

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקרר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- יש ליטול את התכשיר על בטן ריקה עם כוס מים, שעה לפני הארוחה או שעתים אחריה
- אין לאכול אשכוליות או לשותות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- אין לשתות אלכוהול בתקופת הטיפול בתרופה

**דגשים בטיפול:**

- יש לעקוב אחר בדיקות כימיה בדם, מינון הטיפול יותאם לפי החלטת הרופא
- שימוש בתרופה זו מחייב טיפול מונע לבחילה והקאות
- יש לפעול למניעת חבלות, פציעות ומחלות בעת נטילת תרופה זו

**תגובות בין תרופתיות:**

- במידה וקיבלת טיפול בקרינה, דווח לרופא האונקולוג המטפל

**תופעות לוואי:**


- התקרחות
- צמרמורת
- שלשול, אבדן תיאבון, בחילה, הקאות
- תחושת נמלול, רדימות או כאב בכפות הידיים, ברגליים או בזרועות
- חום
- חולשה, עייפות
- צבע צהבהב של העור או בלובן העיניים
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת.
- תסמונת דמויית שפעת המתבטאת בכאבי שרירים, חולשה, חום

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידית/פנייה לטיפול דחוף:**

- חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- תגובה אלרגית: פריחה ו/או גרד, נפיחות בפנים או כפות הידיים, נפיחות או עקצוץ בפה או בלוע, לחץ בחזה, קוצר נשימה וקושי בבליעה
- דם בשתן או בצואה
- צבע כחול בצפרניים, שפתיים, עור, או כפות הידיים (כחלון פריפרי)

- טשטוש או שינוי בראייה
- בלבול, חוסר מנוחה או אבדן הכרה
- דופק לב איטי, מהיר או לא סדיר
- עלייה בהזעה או צמרמורת
- סחרחורת או תחושת עילפון
- כיבים בפה אם הם מונעים ממך לאכול
- רעד ופרוכוסים
- שלשול מעל 4 פעמים ביום
- קוצר נשימה או קושי לנשום, לחץ בחזה או בגרון, חרחורים
- נפיחות בפנים, בפה או בלשון
- שטף דם או דימום לא סביר
- עייפות או חולשה יוצאי דופן

ETOPOSIDE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



MELPHALAN	שם התרופה:
Alkeran	שם מסחרי:
טבליות לבנות בחוזק של 2 מ"ג	צורת הגשה:
טיפול במיאלומה נפוצה, סרטן אשכים, שד, שחלה, מלנומה וסרקומה	מטרת הטיפול:

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לאחסן תרופה זו במקרר ובאריזתה המקורית על מנת להגן עליה מאור
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים בטיפול:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, כימיה ובדיקות שתן לנוכחות תאי דם אדומים וסימנים אחרים לפגיעה בכליות או בדרכי השתן
- יש לפעול למניעת חבלות, פציעות ומחלות בעת נטילת תרופה זו
- תרופה זו יכולה לפגוע בפוריות


**תופעות לוואי:**

- כיבים בפה
- צבע צהבהב בעור או בלובן העין
- אדמומיות או פריחה בעור

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:**

- חום מעל 38 וצמרמורת
- תגובה אלרגית: פריחה ו/או גרד, נפיחות בפנים או כפות הידיים, נפיחות או עקצוץ בפה או בלוע, לחץ בחזה, קוצר נשימה
- דם בצואה או בשתן
- גידול או בלוטה חדשה תחת העור
- קושי או כאב בשעת נשימה
- בחילה, הקאות או שלשולים מעל 4 פעמים ביום
- חום לא מוסבר, צמרמורת, שיעול
- שטף דם, דימום או חולשה יוצאי דופן

MELPHALAN



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו





שם התרופה:	HYDROXYUREA
שם מסחרי:	Hydrea ,Droxia
צורת הגשה:	קפלייה המופיעה בשני צבעים בחוזק של 500 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן צוואר הרחם, שחלות ורחם, ריאות מסוג תאים שאינם קטנים, לויקמיה מיאלואידית כרונית. מגביר רגישות לקרינה בעת טיפול בסרטן המוח, בגידולי ראש צוואר

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש ליטול את התרופה מידי יום בשעה קבועה

**תופעות לוואי:**

- שיעול, כאב גרון וכאבים בגוף
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- בחילה, הקאות, אבדן תיאבון או כאב בקיבה
- הירדמות, עקצוצים שריפה או כאב בכפות הרגליים או הידיים
- צבע צהבהב בעור או בעיניים

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- שלשולים מעל 4 פעמים ביום
- כיבים בפה, ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב או דימום
- בלבול, ישנוניות יתר ושינויים בהתנהגות
- תגובה אלרגית: פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- צואה שחורה או בהירה
- שינויים בכמות השתן או בתכיפות מתן השתן, קושי או כאב במתן שתן
- פרכוסים
- קוצר נשימה
- דימום יוצא דופן, שטף דם או חולשה

HYDROXYUREA



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	BUSULFAN
שם מסחרי:	Myleran
צורת הגשה:	טבליות לבנות בחוזק של 2 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בלויקמיה והכנה להשתלת מח עצם

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- כיבים בפה, בושט ובפי הטבעת
- הגורמים לכאב ולדימום
- כאבים בחזה
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- צואה דמית או שחורה
- שיעול עם ליחה דמית
- פרכוסים
- שטף דם, דימום לא סביר, חולשה או חיוורון

**תופעות לוואי:**

- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- סחרחורת, כאב ראש, חוסר שינה, חולשה ועייפות
- כאבים בחזה, יתר לחץ דם, דופק מואץ, בצקת
- בחילה, הקאות, חוסר תיאבון, שינויים בטעם, קושי בבליעה, דלקת ברירת הפה וירידה במשקל
- שלשולים או עצירות
- פריחה
- חרדה
- שיעול, נזלת
- חום, כאבים, צמרמורת
- כאבי ראש, שיעול, נזלת, כאב גרון או כאבים בגוף
- כאבי פרקים, כאבי שרירים
- אבדן תיאבון, בחילה, הקאות, יובש בפה, גיהוקים, ירידה במשקל, התכוות של העור

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש ליטול את התרופה עם כוס מים בזמנים קבועים

**תגובות בין תרופתיות:**

- רצוי להימנע מטיפול בתרופה פלג'יל בעת הטיפול בתרופה זו

BUSULFAN



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.  
 \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	CHLORAMBUCIL
שם מסחרי:	Leukeran
צורת הגשה:	טבליות לבנות בחוזק של 2 מ"ג, 5 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בלויקמיות ולימפומות.

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור את התרופה במקרר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש ליטול את התרופה על בטן ריקה, לפחות שעה לפני או שעתיים אחרי ארוחה, עם כוס מים בזמנים קבועים

**תגובות עם תרופות ומזון:**

- במידה וקיבלת טיפול בקרינה, דווח לרופא האונקולוג המטפל

**תופעות לוואי:**

- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- כאב גרון, אזניים או סינוסים, שיעול, כאב במתן שתן, כיבים בפה, פצעים שאינם מחלימים, כאב או גרד בפי הטבעת
- שתן כהה, עייפות, חוסר תיאבון, כאב בטן, צואה בהירה, הקאות או צבע צהבהב בעור או בעיניים

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- כיבים בפה, ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב או דימום
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- בלבול ו/או הזיות
- שטף דם או דימום
- תחושה של שריפה, נמלול או הירדמות באיבר מסוים
- שינוי בשיווי משקל
- חולשת שרירים או עייפות
- פרכוסים
- קוצר נשימה
- הקאות מעל 4 פעמים ביום

CHLORAMBUCIL



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.  
 \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	LOMUSTIN
שם מסחרי:	CeeNu
צורת הגשה:	קפסולות בחוזק של 10, 40 או 100 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן לבלב, כבד, קיבה, מעי גס גידולים במוח, מיאלומה נפוצה, לימפומות

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש ליטול את התרופה על קיבה ריקה, לפחות שעתים לפני או שעתים אחרי ארוחה
- יש ליטול את התרופה עם כוס מים בזמנים קבועים
- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול

**תופעות לוואי:**


- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- בחילה הקאות חוסר תיאבון, שינויים בטעם, קושי בבליעה
- ירידה או הפרעות בראייה
- נזק לכליות

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות
- כיבים בפה, בושט ובפי הטבעת הגורמים לכאב או דימום
- בלבול ו/או הזיות
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום

- קוצר נשימה
- חוסר יכולת להטיל שתן, שינוי בכמות השתן, דם בשתן או עלייה גדולה (ומהירה) במשקל
- בלבול או שינוי במצב הרוח
- שטף דם או דימום, שיעול או הקאות דמיות, צואה אדומה או שחורה
- שינוי בשיווי משקל
- קושי בדיבור
- שינוי בראייה

LOMUSTIN



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



MERCAPTOPYRINE	שם התרופה:
Purinetho 6MP	שם מסחרי:
טבליה של 50 מ"ג בצבע לבן	צורת הגשה:
לויקמיות ולימפומה שאינה הודג'קין	מטרת הטיפול:

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- רצוי ליטול את התרופה על בטן ריקה לפחות שעתיים לפני או שעתיים אחרי ארוחה עם כוס מים בזמנים קבועים
- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש להקפיד על שתייה של 10-8 כוסות נוזלים ביום

**תגובות בין תרופתיות:**

- יש ליידע את הרופא במקרה של טיפול בתרופה קומדין במקביל לתרופה זו. ייתכן צורך בהעלאת מינון הקומדין


**תופעות לוואי:**

- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- צואה כהה, שתן כהה, עייפות, בחילה, חוסר תיאבון, כאב בטן, צואה בהירה, הקאות או צבע צהבהב בעור או בעיניים
- חולשה, שטף דם או דימום לא סביר
- כאב גרון, שיעול וכאבים בגוף
- שינוי בצבע לחמיות העיניים והעור
- כאבים חוזרים או נפיחות בפרקים

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידית/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- כיבים בפה, ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב או לדימום
- קוצר נשימה

MERCAPTOPYRINE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



METHOTREXATE	שם התרופה:
Trexal MTX	שם מסחרי:
טבליות בצבע צהוב בחוץ של 2.5 מ"ג, 10 מ"ג	צורת הגשה:
טיפול בליוקמיות, לימפומה ע"ש הודג'קין, לימפומה שאינה הודג'קין, גרורות במערכת העצבים המרכזית, סרטן שד, ריאות, רחם, גידולי ראש צוואר, סרקומה, דלקת פרקים שגרונית	מטרת הטיפול:

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- וודא מינון התרופה ותדירות נטילתה
- יש ליטול את התרופה עם כוס מים בזמנים קבועים
- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכוליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש להקפיד על שתייה של 10-8 כוסות נוזלים ביום
- טיפול זה מלווה בדרך כלל במתן חומצה פולית, להפחתת רעילות התרופה

**תגובות בין תרופתיות:**

- במקרה של טיפול משולב עם התרופה קומדין יש צורך לעקוב אחר רמת ה-INR. ייתכן צורך בהפחתת מינון קומדין

**תופעות לוואי:**

- ירידה במספר הטסיות בדם העלולה להתבטא בדימומים מהחניכיים, מהאף ומפי הטבעת


- כאבי בטן, פצעים בחלל הפה, בחילה, הקאות, שלשולים, בעיות בעיכול, אבדן תיאבון
- רגישות לאור
- שינוי והתכהות העור, פריחה, נשירת שיער, תחושת שריפה בעור
- שיבוש בתפקודי הכבד
- כאבי ראש
- ברונכיטיס ודלקת בקנה הנשימה

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:**

- חום מעל 38 וצמרמורות
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- שתן כהה או צואה בהירה, צבע צהבהב בעור או בעיניים
- חולשה, שטף דם או דימום לא שגרתיים
- שלפוחיות, קילוף או פריחה בעור

- שיעול, חום, כאבים בחזה, קושי לנשום, שפתיים או אצבעות כחולות
- פצעים או כתמים לבנים על הלשון, בפה או בגרון

METHOTREXATE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדף ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	NILOTINIB
שם מסחרי:	Tasigna
צורת הגשה:	קפסולות בחוזק של 150 או 200 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בלויקמיה מיאלואידית כרונית בעלת שינוי גנטי (פילדלפיה חיובי)

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש לבצע מעקב א.ק.ג.
- יש ליטול את התרופה על בטן ריקה, לפחות שעתים אחרי הארוחה או שעה לפני עם כוס מים בזמנים קבועים

**תגובות בין תרופתיות:**

- אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי).
- יש להקפיד על שתייה של 10-8 כוסות נוזלים ביום
- תרופות כגון אומפרדקס, לנטון, נקסיום או גסטרו מורידות מאד את הספיגה של התרופה זו. במידה ונדרש טיפול במקביל אחת התרופות הללו, יש ליטול אותן בהפרש של 12 שעות מתרופה זו

**תופעות לוואי:**


- נשירת שיער, יובש בעור, הזעה בלילה, פריחה ו/או גרד
- כאבי בטן, עצירות, שלשול, בעיות בעיכול, בחילה, הקאות
- כאבי פרקים או שרירים, כאבי ראש
- חולשה, לאות
- שיעול, דלקת בקנה הנשימה
- חום, צמרמורת, שיעול, נזלת, כאב גרון, כאבים בגוף

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- שינוי בתכיפות מתן שתן
- שינויים בדופק הלב
- כאבים בחזה

- שתן כהה או צואה בהירה, בחילה, הקאות, אבדן תיאבון, כאב בטן, צבע צהבהב בעור או בעיניים
- כאב בטן פתאומי וחזק, בחילה, הקאות וחום
- כאב ראש פתאומי או חזק מאד, בעיות עם הראייה, הדיבור או הליכה
- שטפי דם, דימום או חולשה יוצאי דופן
- תחושת עילפון או סחרחורת

NILOTINIB



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	THALIDOMIDE
שם מסחרי:	TNF-alpha
צורת הגשה:	קפסולה בחוזק של 5, 10, 15, 20 או 25 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול במיאלומה נפוצה

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במקרה ששכחת ליטול את התרופה, ניתן ליטול אותה עד 12 שעות מאוחר יותר מזמן הנטילה
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- הרגיל שלך אין ליטול מנה כפולה
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- אסור ליטול את התרופה בזמן הריון
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש לקחת את התרופה לפני השינה ולפחות שעה לאחר ארוחת הערב עם כוס מים
- יש לקום לאט משכיבה או ישיבה
- אין לשתות אלכוהול בעת הטיפול בתרופה זו

**תגובות בין תרופתיות:**

- במקרים של נטילה משולבת עם טקסוטר יש ליידיע את הרופא במידה ומופיע כאב, אדמומיות, חום או נפיחות ברגליים

**תופעות לוואי:**

- בצקת, יובש בעור, פריחה
- עלייה או ירידה במשקל
- עצירות, שלשול, בחילה, בעיות בעיכול
- חולשת שרירים, חולשה כללית
- בלבול, סחרחורת
- קוצר נשימה

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורות
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- שינוי בתכיפות מתן שתן או כמות השתן
- שינויים בדופק הלב
- כאבים בחזה, קושי לנשום, הזעה או שיעול עם כיח דמי

- כאב בטן פתאומי וחזק, בחילה, הקאות וחום
- חולשה או הירדמות בצד אחד של הגוף, כאב ראש פתאומי או חזק מאד, בעיות עם הראייה, הדיבור או הליכה
- כאב בשוק ימין או שמאל
- כאבים או נפיחות בפרקים, כאב בגב או בצד, נפיחות ברגליים או כפות הרגליים
- שטפי דם, דימום או חולשה יוצאי דופן
- פרכוסים
- ישנוניות

THALIDOMIDE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדף ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו





שם התרופה:	TOPOTECAN
שם מסחרי:	Hycamtin
צורת הגשה:	קפסולה בחוזק של 0.25 מ"ג או 1 מ"ג בצבע לבן או ורוד בהתאמה
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן ריאה מסוג תאים קטנים (SCLC)

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור את התרופה במקרר באריזתה המקורית על מנת להגן עליה מאור, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול


**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- חום מעל 38 מעלות וצמרמורות
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- שלשול מעל 4 פעמים ביום
- שטף דם או דימום יוצאי דופן
- עייפות או חולשה יוצאי דופן

**תופעות לוואי:**

- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- נשירת שיער, פריחה
- כאב בטן, עצירות, שלשול, בחילה, הקאות, כיבים בפה, ירידה בתיאבון
- חולשה, כאב ראש
- שיעול, קוצר נשימה
- לאות ועייפות
- שיעול, נזלת, כאב גרון, כאבים בגוף

TOPOTECAN



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.  
 \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	THIOGUANINE
שם מסחרי:	Thioguanine ;6-TG-6
צורת הגשה:	טבליה בצבע לבן בחוזק של 40 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בליוקמיה לימפואידית חריפה, לויקמיה מיאלואידית חריפה, לויקמיה מיאלואידית כרונית

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- את הטבליה יש לקחת על בטן ריקה שעה לפני הארוחה או שעתיים אחרי הארוחה, עם כוס מים בזמנים קבועים, כחצי שעה לאחר נטילת נוגדי בחילה
- יש להקפיד על שתיה של 10-8 כוסות נוזלים ביום
- אין לשתות אלכוהול בזמן הטיפול בתרופה זו

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- שינויים בצבע הפרשות
- סחרחורת או עלפון
- בחילה, הקאות, אבדן תיאבון, כאב בטן, כיבים בפה אשר מונעים ממך לשתות
- חוררן, חולשה
- שטף דם או דימום יוצאי דופן

**תופעות לוואי:**

- בחילה והקאות
- שיעול, נזלת, כאב גרון, כאבים בגוף
- צבע צהבהב בעור או בלובן העיניים

THIOGUANINE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	PROCARBAZINE
שם מסחרי:	Matulane
צורת הגשה:	קפסולה בחוזק של 50 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בלימפומה ע"ש הודג'קין, גליובלסטומה

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר באריזתה המקורית על מנת להגן עליה מאור. אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- להמנע ממזון המכיל טיראמין: בירה, יין, גבינות מיושנות, כבד עוף בשר מיושן או מרוכך, צימוקים, שוקולד, אבוקדו ובננות
- את הטבליה יש ליטול 30 דקות לאחר נטילת נוגדי בחילה ולפני השינה, עם כוס מים בזמנים קבועים
- אין לשתות אלכוהול
- מומלץ להמנע מעישון

**תגובות בין תרופתיות:**

- יש ליידע את הרופא באם הינך נוטל אחת מהתרופות שלהן התנגשות משמעותית עם תרופה זו: אוקסיקונטין, ונטולין, טרמדקס, מורפין, רמוטיב

**תופעות לוואי:**

- בחילה, הקאות
- כאב גרון
- פריחה
- צבע צהבהב בעור או בלובן העיניים

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידית/ פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- בלבול, דופק לא סדיר, קוצר נשימה, הירדמות או נמלול בידיים, ברגליים או בשפתיים
- שלשול מעל 4 פעמים ביום
- כיבים חמורים בפה המונעים ממך לשתות
- שטף דם, דימום או חולשה יוצאי דופן

PROCARBAZINE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו



שם התרופה:	IBRUTINIB
שם מסחרי:	Imbruvica
צורת הגשה:	כמוסות בחוזק של 140 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בלימפומה מסוג MCL ולויקמיה לימפוציטית כרונית (CLL)

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- יש ליטול את התרופה עם כוס מים בזמנים קבועים
- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה אחת לחודש
- אין לאכול אשכוליות או תפוזי חושחש (Seville Orange) או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- יש להקפיד על שתייה של לפחות 6-7 כוסות נוזלים ביום
- לפני ואחרי ניתוח, יש לשקול הפסקת התרופה ל: 3-7 ימים (בכל פעולה כירורגית כמו גם עקירת שן)

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- תופעות אלרגיה חמורות: קשוי נשימה - להפסיק את הטיפול ולפנות לחדר מיון
- פריחה, נפיחות בפנים או כפות הידיים, נפיחות ועקצוץ בפה או בגרון
- דימומים (למשל ממערכת העיכול) או שטפי דם יוצאי דופן
- ירידה בתכיפות ובכמות השתן, כאב בצד או בגב תחתון
- שלשולים מעל 4 פעמים ביום
- קצב לב מהיר או לא סדיר, סחרחורת או עילפון
- חולשה יוצאת דופן

**תופעות לוואי:**

- בצקת
- פריחה
- עלייה בריכוז חומצה אורית בדם
- כאבי בטן, עצירות, שלשול, ירידה בתיאבון, בחילה, הקאה, כיבים בפה
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה בספירת תאי דם אדומים, נויטרופילים ובהמוגלובין ועלול להתבטא בדימומים מהאף, מהחניכיים ומפי הטבעת
- כאבי פרקים ושרירים

IBRUTINIB



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדף ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו