



שם התרופה:	LAPATINIB DITOSYLATE
שם מסחרי:	Tykerb
צורת הגשה:	קפלייה בצבע קרם בחוזק של 250 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן שד

הנחיות כלליות:

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

דגשים על אופן הנטילה:

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש ליטול את התרופה על בטן ריקה לפחות שעה לפני או שעתיים אחרי ארוחה
- חשוב לבצע מעקב אחר תפקוד הלב והריאות
- אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- חוסר שינה
- קוצר נשימה
- תסמונת כף היד והרגל (Hand and foot syndrome) העלולה להתבטא בנפיחות, כאבים, אדמומיות ורגישות בכפות הרגליים והידיים, שינויים בתחושה, עקצוץ, שלפוחיות וקילוף העור בכפות הידיים והרגליים, בצקות וכאבים
- בחילה, הקאות, אבדן תיאבון או צבע צהבהב בעור או בעיניים

תגובות בין תרופתיות:

- אין ליטול תרופה זו יחד עם פלוקונול(פלוקונזול) או מולטק


תופעות לוואי:

- שלשול, בחילה והקאות
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת.
- חולשה ועייפות משמעותית (לאות)
- פריחה
- כאבי ראש וכאבים בזרועות ורגליים

תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורות
- כאבים בחזה, קוצר נשימה שינויים בלחץ דם או עייפות ניכרת
- כיבים בפה הגורמים לקושי בבליעה
- שלשולים מעל 4 פעמים ביום

LAPATINIB DITOSYLATE



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. * המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו