



שם התרופה:	LENALIDOMIDE
שם מסחרי:	Revlimide
צורת הגשה:	קפסולה בצבע לבן או משולב תכלת ולבן בהתאם לחוזק התרופה: 5, 10, 15, 25 מ"ג
מטרת הטיפול:	תסמונת מיאלואידית (MDS), מיאלומה נפוצה

הנחיות כלליות:

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועדה הקבוע, ניתן ליטול אותה באיחור של עד 12 שעות. אם עברו יותר מ-12 שעות יש לדלג על נטילת התרופה באותו יום
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התרופה:

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש ליטול את התרופה עם כוס מים בזמנים קבועים
- אדמומיות, קילוף או שלפוחיות בעור
- שתן כהה או צואה בהירה, בחילה, הקאות, אבדן תיאבון, כאב בטן, צבע צהבהב בעור או בעיניים
- כאבים בשוקיים

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידית/ פנייה לטיפול דחוף:

- עליית חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- כיבים בפה, בושט ובפי הטבעת הגורמים לכאב או לדימום
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- שינוי בתכיפות מתן שתן
- קצב לב לא סדיר או פרכוסים
- כאבים בחזה, קושי בנשימה או קיא דמי
- ירידה בתחושה או חולשה בצד אחד של הגוף, כאב ראש פתאומי או חזק מאד, בעיות עם הראייה, הדיבור או הליכה
- שטפי דם, דימום יוצא דופן או חולשה

תופעות לוואי:

- בצקות
- פריחה
- ירידה במשקל
- סחרחורת, כאב ראש, רעד
- טשטוש ראייה
- שיעול, קוצר נשימה, דלקת גרון
- עייפות ולאות
- חום
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- התכווצויות בשרירי הרגליים, כאבי פרקים, כאב גב
- שלשולים, עצירות, בחילה והקאות

LENALIDOMIDE



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדף ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. * המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו