



MERCAPTOPYRINE	שם התרופה:
Purinetho 6MP	שם מסחרי:
טבליה של 50 מ"ג בצבע לבן	צורת הגשה:
לויקמיות ולימפומה שאינה הודג'קין	מטרת הטיפול:

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התרופה:**

- רצוי ליטול את התרופה על בטן ריקה לפחות שעתיים לפני או שעתיים אחרי ארוחה עם כוס מים בזמנים קבועים
- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש להקפיד על שתייה של 10-8 כוסות נוזלים ביום

**תגובות בין תרופתיות:**

- יש ליידע את הרופא במקרה של טיפול בתרופה קומדין במקביל לתרופה זו. ייתכן צורך בהעלאת מינון הקומדין

**תופעות לוואי:**

- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- צואה כהה, שתן כהה, עייפות, בחילה, חוסר תיאבון, כאב בטן, צואה בהירה, הקאות או צבע צהבהב בעור או בעיניים
- חולשה, שטף דם או דימום לא סביר
- כאב גרון, שיעול וכאבים בגוף
- שינוי בצבע לחמיות העיניים והעור
- כאבים חוזרים או נפיחות בפרקים

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידית/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- כיבים בפה, ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב או לדימום
- קוצר נשימה

MERCAPTOPYRINE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו