



שם התרופה:	SORAFENIB
שם מסחרי:	Nexavar
צורת הגשה:	טבליות לבליעה בצבע אדום חוזק 200 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן כליה ובסרטן הכבד.

הנחיות כלליות:

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/ פנייה לטיפול דחוף:

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורות
- כאבים בחזה, קוצר נשימה או הזעה יוצאת דופן
- סחרחורת או עילפון
- שינויים בדופק הלב
- דימומים מהאף, בשתן, בצואה ושטפי דם בעור

תופעות לוואי:

- עלייה בלחץ הדם
- התקרחות, קילוף של העור, פריחה
- בחילה, הקאות, אבדן תיאבון, כאבי בטן, צבע צהבהב בעור או בעיניים
- תסמונת כף היד והרגל (Hand and foot syndrome) העלולה להתבטא בנפוחות, כאבים, אדמומיות ורגישות בכפות הרגליים והידיים, שינויים בתחושה, עקצוץ ונימול, שלפוחיות וקילוף העור בכפות הידיים והרגליים, בצקות וכאבים.
- ירידה ברמת האלבומין, הסידן או הזרחן בדם
- ירידה במשקל, כאבי בטן, ירידה בתיאבון, שלשול, בחילה
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת.
- עלייה בתפקודי כבד
- עייפות
- זיהומים
- כאבים

דגשים על אופן נטילת התכשיר:

- את התרופה יש ליטול על בטן ריקה עם כוס מים, לפחות שעה לפני הארוחה או שעתיים אחרי הארוחה
- אין ללעוס, למהול ולהמיס את התרופה עם סוגי מזון ומשקאות שונים

דגשים בטיפול:

- השימוש בתרופה עלול להעלות את הסבירות לדימומים. במידה והינך משתמש בתרופות לדילול הדם יש ליידע את האונקולוג המטפל
- השימוש בתרופה עלול להשפיע על קצב ריפוי פצעים
- במהלך תקופת הטיפול בתרופה יש לבצע מעקב וניטור אחר ערכי לחץ דם ולבצע בדיקות דם לכימיה ושתן, לפני התחלת כל מחזור טיפולי וא.ק.ג. לפי החלטת הרופא המטפל

תגובות בין תרופתיות:

- תרופה זו אסורה בשימוש עם תרופות כגון מולטק, דיפלוקן (פלוקנול)

SORAFENIB



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
 * המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו