



SUNITINIB	שם התרופה:
Sutent	שם מסחרי:
כמוסות לבליעה בשני צבעים כתום וקרמל בחוזק של: 50 מ"ג, 25 מ"ג, 12.5 מ"ג	צורת הגשה:
טיפול בסרטן כליה, בסרטן מערכת דרכי העיכול – GIST ובסרטן לבלב (pNET).	מטרת הטיפול:

הנחיות כלליות:

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התכשיר:

- יש ליטול את התרופה מדי יום למשך ארבעה שבועות ובסיומם שבועיים הפסקה או לפי הוראת הרופא האונקולוג המטפל
- אין לפתוח את הכמוסות, ללעוס או למהול עם סוגי מזון ומשקאות שונים
- אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- יש להימנע מטיפולי שיניים חודרניים בזמן הטיפול בתרופה זו

דגשים בטיפול:

- יש לבצע ספירת דם וכימיה ובדיקת חלבון בשתן לפני כל תחילת מחזור טיפול
- יש לעקוב אחר לחץ הדם וא.ק.ג.
- מעקב אקו לב נדרש במידה והנך סובל מבעיות לבביות, אירועים מוחיים וזרימת הדם ובהתאם להנחיית הרופא המטפל

תגובות בין תרופתיות:

- אין ליטול דיפלוקאן (פלוקונאזול) ומולטק יחד עם תרופה זו

תופעות לוואי:

- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מהחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- כאבי בטן, שלשולים, בחילה, הקאות, אי נוחות במערכת העיכול
- עלייה ברמת בילירובין בדם ובשתן
- כאב או זיהום בלסת
- שלפוחיות בכפות הידיים או הרגליים
- דלקת חניכיים, אבדן תיאבון, כאבים בפה, שינוי בתחושת הטעם
- שינוי בצבע השתן
- יובש בעור ובפה, פריחה
- ירידה בתפקוד בלוטת התריס
- פגיעה בתפקודי כבד
- כאב בזרועות וברגליים
- שיעול
- עייפות, חולשה

תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורות.
- נפיחות בפנים, בפה או בגרון
- בלבול, סחרחורת או עילפון

- אבדן תחושה או חולשה בידים, ברגליים או בצד אחד של הגוף
- הופעת כאב ראש חזק מאד או פתאומי או בעיות בראייה, בדיבור או בהליכה
- תסמונת כף היד והרגל (Hand and foot syndrome) העלולה להתבטא בנפיחות כאבים אדמומיות ורגישות ו/או יובש בכפות הרגליים והידיים, שינויים בתחושה, עקצוץ ונימול, שלפוחיות וקילוף העור, בצקות וכאבים
- עלייה מהירה במשקל, בצקת, תחושה של אי סדירות בקצב הלב או הנשימה, עייפות או חולשה קיצוניים
- כיבים או כתמים לבנים בפה או בגרון הגורמים לקושי בבליעה
- דם בשתן, בליחה, צואה כהה
- שלשולים מעל 4 ביום

SUNITINIB



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
 * המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו