



| | |
|--------------|---|
| שם התרופה: | ABIRATERONE ACETATE |
| שם מסחרי: | Zytiga |
| צורת הגשה: | טבלייות לבליעה במינון של 1000 מ"ג (ארבע טבלייות של 250 מ"ג) אחת ליום. |
| מטרת הטיפול: | לטיפול בסרטן ערמונית |

הנחיות כלליות:

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התכשיר:

- את התרופה יש ליטול בשלמותה על בטן ריקה עם כוס מים לפחות שעה לפני או שעתיים אחרי הארוחה
- אין להפסיק טיפול זה אף לזמן קצר מבלי להיוועץ ברופא
- ירידה בספירת הדם הלבנה והאדומה
- חריגה בתפקודי הכבד. שתן כהה, צואה בהירה, הקאות, אבדן תיאבון או כאבי בטן. צבע צהבהב בעיניים או בעור
- עלייה מהירה במשקל או בצקת
- נפיחות בפרקים, כאבי שרירים
- שיעול, דלקת בדרכי הנשימה
- העליונות, קוצר נשימה ודלקת בלוע

דגשים בטיפול:

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם וכימיה, לפני תחילת כל מחזור הטיפול ולפני הנחיות הצוות המטפל
- אין לאכול אשכוליות או לשותות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)


תופעות לוואי:

- בצקת, עלייה בלחץ הדם
- עייפות, חוסר שינה
- גלי חום
- עלייה ברמת השומנים, הסוכר והנתרן בדם. ירידה ברמת האשלגן והזרחן בדם
- יובש בפה, צמא, בחילה או הקאות
- עצירות, שלשול, צרבת
- דלקות בדרכי השתן

תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- סחרחורת, עילפון
- כאבי שרירים
- לחץ או כאבים בחזה, קשיי נשימה, שינויים קיצוניים בדופק
- נפיחות בעור, בפנים, כף היד וכף הרגל
- עייפות קיצונית, חולשה או ישנוניות

ABIRATERONE ACETATE



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. * המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו