



שם התרופה:	CHLORAMBUCIL
שם מסחרי:	Leukeran
צורת הגשה:	טבליות לבנות בחוזק של 2 מ"ג, 5 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בלויקמיות ולימפומות.

הנחיות כלליות:

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור את התרופה במקרר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התרופה:

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש ליטול את התרופה על בטן ריקה, לפחות שעה לפני או שעתיים אחרי ארוחה, עם כוס מים בזמנים קבועים

תגובות עם תרופות ומזון:

- במידה וקיבלת טיפול בקרינה, דווח לרופא האונקולוג המטפל

תופעות לוואי:

- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- כאב גרון, אזניים או סינוסים, שיעול, כאב במתן שתן, כיבים בפה, פצעים שאינם מחלימים, כאב או גרד בפי הטבעת
- שתן כהה, עייפות, חוסר תיאבון, כאב בטן, צואה בהירה, הקאות או צבע צהבהב בעור או בעיניים

תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:

- עליית חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- כיבים בפה, ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב או דימום
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- בלבול ו/או הזיות
- שטף דם או דימום
- תחושה של שריפה, נמלול או הירדמות באיבר מסוים
- שינוי בשיווי משקל
- חולשת שרירים או עייפות
- פרכוסים
- קוצר נשימה
- הקאות מעל 4 פעמים ביום

CHLORAMBUCIL



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
 * המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו