



שם התרופה:	ETOPOSIDE
שם מסחרי:	VP-16 , Vepesid
צורת הגשה:	קפלויות לבליעה. בחוזק של 50 מ"ג ו 100 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן אשכים, סרטן שד, סרטן ראות, לימפומה, לויקמיה, הודגליקין, סרטן שחלות והשתלות מח עצם

הנחיות כלליות:

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקרר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התכשיר:

- יש ליטול את התכשיר על בטן ריקה עם כוס מים, שעה לפני הארוחה או שעתים אחריה
- אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
- אין לשתות אלכוהול בתקופת הטיפול בתרופה

דגשים בטיפול:

- יש לעקוב אחר בדיקות כימיה בדם, מינון הטיפול יותאם לפי החלטת הרופא
- שימוש בתרופה זו מחייב טיפול מונע לבחילה והקאות
- יש לפעול למניעת חבלות, פציעות ומחלות בעת נטילת תרופה זו

תגובות בין תרופתיות:

- במידה וקיבלת טיפול בקרינה, דווח לרופא האונקולוג המטפל

תופעות לוואי:


- התקרחות
- צמרמורת
- שלשול, אבדן תיאבון, בחילה, הקאות
- תחושת נמלול, רדימות או כאב בכפות הידיים, ברגליים או בזרועות
- חום
- חולשה, עייפות
- צבע צהבהב של העור או בלובן העיניים
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת.
- תסמונת דמויית שפעת המתבטאת בכאבי שרירים, חולשה, חום

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידית/פנייה לטיפול דחוף:

- חום מעל 38 מעלות, צמרמורת
- תגובה אלרגית: פריחה ו/או גרד, נפיחות בפנים או כפות הידיים, נפיחות או עקצוץ בפה או בלוע, לחץ בחזה, קוצר נשימה וקושי בבליעה
- דם בשתן או בצואה
- צבע כחול בצפרניים, שפתיים, עור, או כפות הידיים (כחלון פריפרי)

- טשטוש או שינוי בראייה
- בלבול, חוסר מנוחה או אבדן הכרה
- דופק לב איטי, מהיר או לא סדיר
- עלייה בהזעה או צמרמורת
- סחרחורת או תחושת עילפון
- כיבים בפה אם הם מונעים ממך לאכול
- רעד ופרוכוסים
- שלשול מעל 4 פעמים ביום
- קוצר נשימה או קושי לנשום, לחץ בחזה או בגרון, חרחורים
- נפיחות בפנים, בפה או בלשון
- שטף דם או דימום לא סביר
- עייפות או חולשה יוצאי דופן

ETOPOSIDE



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו