



שם התרופה:	EVEROLIMUS
שם מסחרי:	Afinitor
צורת הגשה:	טבליות לבליעה בחוזק של 2.5, 5, 10 מ"ג
מטרת הטיפול:	טיפול בסרטן כליה וסרטן שד

הנחיות כלליות:

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- אין ליטול תרופה זו במקרה של רגישות ידועה לתרופות דומות כגון Torisel (Temsirolimus) או Rapamune (Sirolimus)
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במקרה ששכחת ליטול את התרופה, ניתן ליטול אותה עד 6 שעות מאוחר יותר מזמן הנטילה הרגיל שלך
- אין ליטול מנה כפולה
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסונים
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התכשיר:

- יש ליטול את התרופה פעם ביום עם כוס מים בזמנים קבועים

דגשים בטיפול:

- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם וכימיה, לפני תחילת כל מחזור הטיפול ולפי הנחיית הצוות המטפל
- לפני תחילת הטיפול בתרופה יש לסיים טיפול בזיהומים חידקים ו/או פטרייתיים
- תרופה זו יכולה לגרום רגישות של העור לשמש. יש להקפיד להשתמש בקרם הגנה עם מסנן קרינה 34 לפחות
- אין לאכול אשכוליות או לשנות מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)

תופעות לוואי:

- שיעול, קוצר נשימה, זיהומים בדרכי הנשימה
- כאב גרון וכאבים בנזף
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידית/ פנייה לטיפול דחוף:

- עליה בחום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- קוצר נשימה ושיעול טורדני, נפיחות בפנים, בידיים, ברגליים, בלשון או בגרון
- הפרעות בראייה
- כאבים בחזה או שינוי קיצוני בקצב הלב (מהיר או איטי)
- ירידה חמורה בתדירות וכמות השתן, כאבים במתן שתן, שתן עכור או דמי
- כאבי שרירים, רעד, בחילה והקאות
- דימום/חולשה משמעותיים

- לחץ דם גבוה, בצקת ברגליים/ידיים
- פצעים, כיבים או כתמים לבנים בשפתיים, בפה או בלוע
- שינויים בעור
- עלייה ברמת הסוכר והשומנים בדם, ירידה ברמת החלבון והזרחן בדם. גוון צהבהב בעור או בעיניים
- עצירות, שלשול, ירידה בתיאבון, בחילה, הקאות, קושי בבליעה
- חריגה בתוצאות בדיקות תפקודי הכבד
- עיכוב בריפוי פצעים
- דלקות אזניים
- ירידה בתפקוד הכליות, זיהומים בדרכי השתן
- שינויים בוסת (כולל היעלמותה)
- עייפות, חום

EVEROLIMUS



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. * המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו