



METHOTREXATE	שם התרופה:
Trexal MTX	שם מסחרי:
טבליות בצבע צהוב בחוץ של 2.5 מ"ג, 10 מ"ג	צורת הגשה:
טיפול בלויקמיות, לימפומה ע"ש הודג'קין, לימפומה שאינה הודג'קין, גרורות במערכת העצבים המרכזית, סרטן שד, ריאות, רחם, גידולי ראש צוואר, סרקומה, דלקת פרקים שגרונית	מטרת הטיפול:

הנחיות כלליות:

- **דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל**
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התרופה:

- וודא מינון התרופה ותדירות נטילתה
- יש ליטול את התרופה עם כוס מים בזמנים קבועים
- יש לבצע מעקב אחר ספירת דם, תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
- יש להקפיד על שתיה של 10-8 כוסות נוזלים ביום
- טיפול זה מלווה בדרך כלל במתן חומצה פולית, להפחתת רעילות התרופה

תגובות בין תרופתיות:

- במקרה של טיפול משולב עם התרופה קומדין יש צורך לעקוב אחר רמת ה-INR. ייתכן צורך בהפחתת מינון קומדין

תופעות לוואי:

- ירידה במספר הטסיות בדם העלולה להתבטא בדימומים מהחניכיים, מהאף ומפי הטבעת

- כאבי בטן, פצעים בחלל הפה, בחילה, הקאות, שלשולים, בעיות בעיכול, אבדן תיאבון
- רגישות לאור
- שינוי והתכהות העור, פריחה, נשירת שיער, תחושת שריפה בעור
- שיבוש בתפקודי הכבד
- כאבי ראש
- ברונכיטיס ודלקת בקנה הנשימה

תופעות לוואי המחייבות דיווח מייד/פנייה לטיפול דחוף:

- חום מעל 38 וצמרמורות
- תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד, נפיחות בידיים או בפנים, נפיחות או נמלול בפה או בגרון, לחץ בחזה, קושי לנשום
- שתן כהה או צואה בהירה, צבע צהבהב בעור או בעיניים
- חולשה, שטף דם או דימום לא שגרתיים
- שלפוחיות, קילוף או פריחה בעור

- שיעול, חום, כאבים בחזה, קושי לנשום, שפתיים או אצבעות כחולות
- פצעים או כתמים לבנים על הלשון, בפה או בגרון

METHOTREXATE



* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדף ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. * ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו