



שם התרופה:	TEMOZOLOMIDE
שם מסחרי:	Temodal
צורת הגשה:	קפסולות של 5 מ"ג, 20 מ"ג, 100 מ"ג, 250 מ"ג
מטרת הטיפול:	לטיפול בגידולי מח ומלנומה

**הנחיות כלליות:**

- דווח לרופא על כל טיפול תרופתי, צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
- הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל: במינון, באופן ובמועד
- יש לאחסן תרופה זו במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה
- במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
- במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל
- יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
- יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
- יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול
- חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות 8 שבועות לאחר תום הטיפול
- אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
- את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל, אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
- בכל שינוי במצב בריאותך, דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל 38 מעלות, דימומים ועוד)

**דגשים על אופן נטילת התכשיר:**

- יש ליטול את המנה פעם ביום
- יש ליטול התרופה על קיבה ריקה: שעה לפני האוכל או כשעתיים לאחר האוכל או לפני השינה כדי להקטין את הסיכוי לבחילה
- יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה עם כוס מים

**דגשים בטיפול:**

- רצוי ליטול תרופה למניעת בחילה המופיעה לעיתים קרובות עם טיפול זה
- השימוש בתרופה פוגע בערנות ומחייב זהירות בנהיגה ברכב ובהפעלת ציוד מסוכן ובהתנהלות היומיומית
- יש לבצע מעקב אחר ספירת הדם וכימיה לפני התחלת כל מחזור טיפול
- התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לרגישות בחולים הרגישים ללקטוז
- תרופה זו יכולה לגרום לדימומים, שטפי דם או זיהומים

**תגובות בין תרופתיות:**

- חשוב לדווח לרופא המטפל על נטילת תרופות מהקבוצות הבאות: רספרים, פניטואין, חומצה ולפורית ותרופות המדכאות את מערכת החיסון


**תופעות לוואי:**

- בצקת
- שלשול, עצירות, בחילה, הקאות
- דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה במספר תאי דם לבנים, אדומים וטסיות ולגרום לדימומים מחניכיים, מהאף ומפי הטבעת
- כאבי ראש
- עייפות
- התקרחות
- פריחה, קילוף או שלפוחיות בעור
- שיעול, כאב גרון וכאבים בגוף
- עייפות קיצונית וישנוניות
- שינויים בצבע העור או ההפרשות
- הקאות, אבדן תיאבון, כאבי בטן

**תופעות לוואי המחייבות דיווח מידי/פנייה לטיפול דחוף:**

- עליית חום מעל 38 מעלות וצמרמורת
- קשיי נשימה-להפסיק את הטיפול ולפנות לחדר מיון
- דימום או שטפי דם יוצאי דופן
- פרכוסים

TEMOZOLOMIDE



\* המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסייעוד האונקולוגי כשרות לציבור. אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף ליעוץ ספציפי, רפואי או אחר, לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.  
 \* המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים. חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע, כולו או חלקו